



Visste du att...

Rapportering och statistik

- De som avlidit i/med covid-19 i Sverige har i genomsnitt varit ca 83 år.¹
- 85 % av de avlidna i covid-19 hade en eller flera av de fyra vanligaste sjukdomarna som utgör riskfaktor för allvarlig covid-19-infektion.² Även fetma utgör riskfaktor för allvarlig covidinfektion.³
- Utifrån Socialstyrelsens dödsorsaksintyg och de fyra sjukdomarna samt fetma har endast cirka 5-10 % av totala antalet avlidna enligt dödsorsaksintyg avlidit av covid-19 som enda orsak till dödsfallet.^{2,3}

- FDA bestämde att resultaten av de pågående studierna av Pfizers vaccin skulle hemlighållas i 75 år. Efter ett domstolsbeslut i USA i januari 2022 har dock Pfizer tvingats att månatligen publicera studiedata.⁹ Av dokumenten framgår att under de första tre månadernas vaccinering inrapporterades 1 223 dödsfall i så kallade adverse events. Detta kan jämföras med att vaccineringen mot svininfluensa i USA 1976 drogs in när 51 av cirka 50 miljoner vaccinerade insjuknat i Guillain-Barrés syndrom. Inget misstänkt dödsfall hade då rapporterats in.^{10,11}

Avtal och ekonomi

- Avtalen mellan vaccintillverkarna och